



Parafinic 85% EC

NOMBRE PRODUCTO	Parafinic 85% EC
TIPO DE PRODUCTO	Insecticida
INGREDIENTE ACTIVO	Aceite mineral
NOMBRE QUIMICO	
GRUPO QUIMICO	Derivados del petróleo
CONCENTRACION Y FORMULACION	850 g/L EC, Concentrado Emulsionable
MODO DE ACCION	Contacto e Ingestión.
FABRICANTE/FORMULADOR	ANTALIEN
TOXICIDAD	Grupo IV. Producto que Normalmente no ofrece Peligro
ANTIDOTO	No se conoce un antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Principales Características

Es un aceite mineral refinado especialmente para uso agrícola.

Mejora la dispersión y adherencia de agroquímicos con efecto físico sobre las plagas.

Es compatible con un amplio rango de plaguicidas, no se debe mezclar con productos que contengan azufre.

Está indicado para mezclarse con plaguicidas que controlan las Querasas de los frutales (como cítricos, olivo, palto, mango, etc), araña roja y pulgones en cítricos.

Uso y Dosis

CULTIVOS	USO/Plaga	DOSIS	
		L/200 L	L/ha
Mandarina	Arañita roja (<i>Panonychus citri</i>)	2,5-3,0	-
Vid	Oidiosis (<i>Erysiphe necator</i>)	2,0-3,0	-

Aplicación

Las aplicaciones deben contemplar el nivel de daño económico de la plaga, por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes para determinar el momento de aplicación.

Se recomienda evitar aplicaciones a temperaturas elevadas. No aplicar en plantas estresadas. Evite su uso en plantas en floración.

Las aplicaciones de aceite deben separarse por 12 días después de una aplicación de cloruro de calcio y 8 días cuando ésta es anterior. En cítricos separar la aplicación de aceite por lo menos 30 días después de una aplicación de Azufre.

Preparación de la mezcla

Agitar antes de usar éste producto. Prepare la premezcla colocando la cantidad recomendada del plaguicida, adicione **PARAFINIC 85% EC** en la dosis sugerida y agite suavemente. Añada esta premezcla al tanque de aplicación y nuevamente agite antes de aplicar. Cuando se mezcle más de un plaguicida, prepare cada premezcla por separado.

Cuando mezcle plaguicidas en formulaciones sólidas, disuelva el plaguicida en suficiente agua hasta formar una masa, añada **PARAFINIC 85% EC** en igual volumen del producto. Añada ésta premezcla al tanque de aplicación y agite antes de aplicar.

En el caso de mezclas de más de un pesticida de formulación sólida, disuelva por separado en recipientes individuales, añada **PARAFINIC 85% EC** a cada mezcla, adicione cada premezcla al tanque, hasta el momento de la aplicación.

No mezcle con productos que contengan azufre.

Incompatibilidad

Como es imposible conocer la compatibilidad de **PARAFINIC 85% EC** con todos los productos del mercado, ANTALIEN, no asume responsabilidades por mezclas hechas con otros productos.

Se recomienda no mezclar con productos que contengan azufre, fungicidas como captan, acaricidas como el propargite y fertilizante foliares.

Departamento Técnico Antalien

Perú: Calle Arica N° 125, Ofc 401. Miraflores. Lima. T: 511-4457352

Chile: Padre Mariano N° 391, Ofc 405. Providencia. Santiago. T.: 56-2-240 29 752

www.antalien.net

Fitotoxicidad

Si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta, no es esperable que se produzcan problemas de fitotoxicidad.

Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad, bajo responsabilidad del usuario, para observar los aspectos físicos de las mezclas y sus reacciones sobre las plantas tratadas en los días siguientes a la aplicación.

Período de Carencia Mercado Local (días)

Estos son los días de espera recomendados entre la última aplicación y la cosecha: 0.- Puede ser aplicado hasta la cosecha.

Tiempo de Reingreso al área tratada

No ingresar al área tratada antes de 4 horas desde la aplicación, a menos que se vista ropa de protección.

Observaciones

El fabricante garantiza el porcentaje del contenido activo y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje original cerrado, dentro del plazo establecido en la etiqueta del producto. Las recomendaciones tienen la finalidad de aconsejar al usuario sobre la utilización del producto, sin compromiso, de acuerdo a los últimos conocimientos del fabricante. El usuario asume los riesgos de los daños ocasionados por un almacenamiento o aplicación inadecuados o que no se ajusten a las instrucciones o por factores que escapan a la responsabilidad del fabricante.

Para información respecto a Límites Máximos de Residuos en países de destino para los cultivos, sugerimos consultar con nuestro Departamento Técnico.

Departamento Técnico Antalien

Perú: Calle Arica N° 125, Ofc 401. Miraflores. Lima. T: 511-4457352

Chile: Padre Mariano N° 391, Ofc 405. Providencia. Santiago. T.: 56-2-240 29 752

www.antalien.net

Página 3 de 3
