

Oxamyl 24% SL

NOMBRE PRODUCTO	OXAMYL 24% SL
TIPO DE PRODUCTO	Nematicida
INGREDIENTE ACTIVO	Oxamyl
NOMBRE QUIMICO	N,N-dimethyl-2-methylcarbamoxyimino-2-(methylthio)acetamide
GRUPO QUIMICO	Carbamato
CONCENTRACION Y FORMULACION	240 g/L, Concentrado Soluble
MODO DE ACCION	Sistémico, Contacto e Ingestión
FABRICANTE/FORMULADOR	ANTALIEN
TOXICIDAD	Grupo Ib. Producto Altamente Peligroso.
ANTIDOTO	Si los signos de inhibición de la colinesterasa aparecen, aplicar el antídoto Sulfato de Atropina . No debe administrarse 2-PAM .

Principales Características

Es un nematicida, del grupo de los Carbamatos de acción sistémica, por contacto e ingestión.

Tiene excelente acción contra una amplia gama de nemátodos en diversos cultivos como frijol, apio, algodón, papa, tomate, ajo, naranjo, etc.

Trabaja ocasionando acción neurotóxica, inhibiendo la actividad de la colinesterasa.

Uso y Dosis

CULTIVOS	USO/Plaga	DOSIS	
		L/200 L	L/ha
Frijol	Nematode del nudo de la raiz (<i>Meloidogyne incognita</i>)	0,8	1,5
Papa	Nematode del nudo de la raiz (<i>Meloidogyne incognita</i>) Se recomiendan 2 aplicaciones	-	1
Apio	Nematode del nudo de la raiz (<i>Meloidogyne incognita</i>) Se recomiendan 2 aplicaciones	1	-
Pimiento	Nematode del nudo de la raiz (<i>Meloidogyne incognita</i>)	-	0,75-1,0
Ajo	Nematode del ajo (<i>Ditylenchus dipsaci</i>)	1	-
Tomate	Nematode del nudo de la raiz (<i>Meloidogyne incognita</i>)	-	1

Aplicación

Las aplicaciones deben contemplar el nivel de daño económico de la plaga, por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes para determinar el momento de aplicación.

Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña. Se recomienda hacer su aplicación en las etapas iniciales del establecimiento del cultivo o inicio de campaña en cultivos perennes. Preferentemente la aplicación debe ser dirigida a cuello de planta o vía sistema de riego tecnificado.

Preparación de la mezcla

Coloque agua en estanque hasta la mitad de su capacidad. En un recipiente aparte, diluya la cantidad necesaria de **OXAMYL 24% SL** en un poco de agua y vierta esta solución al estanque a través del filtro. Luego, complete con agua a capacidad total. Durante el proceso de llenado y posterior aplicación, mantener el agitador funcionando constantemente.

Incompatibilidad

Como es imposible conocer la compatibilidad de **OXAMYL 24% SL** con todos los productos del mercado, ANTALIEN, no asume responsabilidades por mezclas hechas con otros productos.

Se recomienda no mezclar con productos de marcada reacción alcalina.

Fitotoxicidad

Si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta, no es esperable que se produzcan problemas de fitotoxicidad. En caso de dudas, se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad, bajo responsabilidad del usuario, para observar los aspectos físicos de las mezclas y sus reacciones sobre las plantas tratadas en los días siguientes a la aplicación.

Período de Carencia Mercado Local (días)

Estos son los días de espera recomendados entre la última aplicación y la cosecha: Frijol y Ajo: 14 días; Pimiento: 7 días; Tomate: 3 días; Papa: 1 día.

Para cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país de destino.

Tiempo de Reingreso al área tratada

No ingresar al área tratada antes de 48 horas desde la aplicación, a menos que se vista ropa de protección.

Observaciones

El fabricante garantiza el porcentaje del contenido activo y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje original cerrado, dentro del plazo establecido en la etiqueta del producto. Las recomendaciones tienen la finalidad de aconsejar al usuario sobre la utilización del producto, sin compromiso, de acuerdo a los últimos conocimientos del fabricante. El usuario asume los riesgos de los daños ocasionados por un almacenamiento o aplicación inadecuados o que no se ajusten a las instrucciones o por factores que escapan a la responsabilidad del fabricante.

Para información respecto a Límites Máximos de Residuos en países de destino para los cultivos, sugerimos consultar con nuestro Departamento Técnico.

Departamento Técnico Antalien

Perú: Calle Arica N° 125, Ofc 401. Miraflores. Lima. T: 511-4457352

Chile: Padre Mariano N° 391, Ofc 405. Providencia. Santiago. T.: 56-2-240 29 752

www.antalien.net

Página 3 de 3
