

# Cyfluthrin 10% EC

NOMBRE PRODUCTO	CYFLUTHRIN
TIPO DE PRODUCTO	Insecticida
INGREDIENTE ACTIVO	Cyfluthrin
NOMBRE QUIMICO	(RS)-alfa-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzil-(1RS,3RS; 1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
GRUPO QUIMICO	Piretroides
CONCENTRACION Y FORMULACION	100 g/L EC, Concentrado Emulsionable
MODO DE ACCION	Contacto, Ingestión
FABRICANTE/FORMULADOR	ANTALIEN
TOXICIDAD	Grupo II Producto Moderadamente peligroso
ANTIDOTO	No se conoce un antídoto específico. Aplicar tratamiento sistomático.

## Principales Características

Es un insecticida piretroide, esencialmente larvicida y adulticida. Posee un inmediato efecto de contacto e ingestión con prolongada acción residual.

Presenta un amplio espectro de acción sobre plagas masticadoras del follaje, logrando también buen control sobre chupadores si el caldo de aspersión toma contacto con ellos. Altamente resistente al lavado por lluvias y de gran estabilidad frente a la luz solar.

## Uso y Dosis

CULTIVOS	USO/Plaga	DOSIS	
		cc/200 L	cc/ha
<b>Papa, Apio y Frijol</b>	Mosca minadora ( <i>Liriomyza huidobrensis</i> )	125	250
<b>Alfalfa</b>	Barrenador de brotes ( <i>Crociosema aporema</i> )	125	250
<b>Tomate</b>	Mosca minadora ( <i>Liriomiza huidobrensis</i> )	125	250
	Oruga minadora de hoja y tallo ( <i>Tuta absoluta</i> )	180	375
	Gusano ejercito ( <i>Spodoptera eridania</i> )	180	375
<b>Maíz</b>	Gusano cogollero ( <i>Spodoptera frugiperda</i> )	100-150	100-150

## Aplicación

Las aplicaciones deben contemplar el nivel de daño económico de la plaga, por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes para determinar el momento de aplicación.

Realizar un máximo de 4 aplicaciones por campaña.

## Preparación de la mezcla

Coloque agua en estanque hasta la mitad de su capacidad. En un recipiente aparte, diluya la cantidad necesaria de **CYFLUTHRIN 10% EC** en un poco de agua y vierta esta solución al estanque a través del filtro. Luego, complete con agua a capacidad total. Durante el proceso de llenado y posterior aplicación, mantener el agitador funcionando constantemente.

## Incompatibilidad

Como es imposible conocer la compatibilidad de **CYFLUTHRIN 10% EC** con todos los productos del mercado, ANTALIEN, no asume responsabilidades por mezclas hechas con otros productos.

Se recomienda no mezclar con productos de marcada reacción alcalina.

## Fitotoxicidad

Si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta, no es esperable que se produzcan problemas de fitotoxicidad.

En caso de dudas, se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad, bajo responsabilidad del usuario, para observar los aspectos físicos de las mezclas y sus reacciones sobre las plantas tratadas en los días siguientes a la aplicación.

Departamento Técnico Antalien

Perú: Calle Arica N° 125, Ofc 401. Miraflores. Lima. T: 511-4457352

Chile: Padre Mariano N° 391, Ofc 405. Providencia. Santiago. T.: 56-2-240 29 752

www.antalien.net

### **Período de Carencia Mercado Local (días)**

Estos son los días de espera recomendados entre la última aplicación y la cosecha: Alfalfa: 7 días; Papa, Tomate, Maíz: 14 días, Apio y Frijol: 3 días.

Para cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país de destino.

### **Tiempo de Reingreso al área tratada**

No ingresar al área tratada antes de 2 horas desde la aplicación, a menos que se vista ropa de protección.

### **Observaciones**

El fabricante garantiza el porcentaje del contenido activo y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje original cerrado, dentro del plazo establecido en la etiqueta del producto. Las recomendaciones tienen la finalidad de aconsejar al usuario sobre la utilización del producto, sin compromiso, de acuerdo a los últimos conocimientos del fabricante. El usuario asume los riesgos de los daños ocasionados por un almacenamiento o aplicación inadecuados o que no se ajusten a las instrucciones o por factores que escapen a la responsabilidad del fabricante.

Para información respecto a Límites Máximos de Residuos en países de destino para los cultivos, sugerimos consultar con nuestro Departamento Técnico.

---

Departamento Técnico Antalien

Perú: Calle Arica N° 125, Ofc 401. Miraflores. Lima. T: 511-4457352

Chile: Padre Mariano N° 391, Ofc 405. Providencia. Santiago. T.: 56-2-240 29 752

[www.antalien.net](http://www.antalien.net)

---

---

Página 3 de 3

---