

Cartap 50% WP

NOMBRE PRODUCTO	CARTAP 50% WP
TIPO DE PRODUCTO	Insecticida
INGREDIENTE ACTIVO	Cartap
NOMBRE QUIMICO	Propano hidrocloreuro de 1,3-bis (carbamoilitio)-2(N,N-dimetiloamino)
GRUPO QUIMICO	Nereistoxinas
CONCENTRACION Y FORMULACION	500 g/kg WP Polvo Mojable
MODO DE ACCION	Sistémico de Contacto e ingestión
FABRICANTE/FORMULADOR	ANTALIEN
TOXICIDAD	Grupo II Producto Moderadamente peligroso
ANTIDOTO	No se conoce un antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Principales Características

Es un insecticida sistémico de contacto e ingestión que tiene una rápida y duradera acción sobre Polilla del tomate y de la papa, Minador de las chacras, Langostino del fréjol y de la papa, Cuncunilla de las hortalizas, Trips de la cebolla, y Cuncunilla de las hortalizas (*Copitarsia turbata*).

Además de ser muy eficaz en el control de larvas, presenta considerable acción contra adultos y larvas próximas a evolucionar.

Tiene acción selectiva y respeta insectos benéficos como abejas.

Se degrada rápidamente en el suelo es fácilmente soluble en agua y no obstruye las boquillas.

Uso y Dosis

CULTIVOS	USO/Plaga	DOSIS	
		g/200 L	g/ha
Algodón	Gusano menor de la hoja (<i>Anomis texana</i>)	-	200
	Gusano mayor de la hoja (<i>Alabama argillacea</i>)	-	200
	Gusano perforador (<i>Bucculatrix thurberiella</i>)	380	750
Tomate	Oruga minadora de hoja y tallo (<i>Tuta absoluta</i>)	400	500 -1500
Papa, Frijol	Mosca minadora (<i>Liriomyza huidobrensis</i>)	800	1600-3000
Frijol	Mosca minadora (<i>Liriomyza huidobrensis</i>)	600	

Aplicación

Iniciar las aplicaciones a la aparición de la plaga y repetir cada 10 a 15 días cuando se observe una reinfestación.

Las aplicaciones deben contemplar el nivel de daño económico de la plaga, por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes para determinar el momento de aplicación.

Preparación de la mezcla

Coloque agua en el estanque hasta la mitad de su capacidad. En un recipiente aparte, diluya la cantidad necesaria de **CARTAP 50% WP** en un poco de agua y vierta esta solución al estanque a través del filtro. Luego, complete con agua a capacidad total. Durante el proceso de llenado y posterior aplicación, mantener el agitador funcionando constantemente.

Incompatibilidad

Como es imposible conocer la compatibilidad de **CARTAP 50% WP** con todos los productos del mercado, ANTALIEN, no asume responsabilidades por mezclas hechas con otros productos.

Se recomienda no mezclar con productos de marcada reacción alcalina.

Fitotoxicidad

Si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta, no es esperable que se produzcan problemas de fitotoxicidad.

En caso de dudas, se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad, bajo responsabilidad del usuario, para observar los aspectos físicos de las mezclas y sus reacciones sobre las plantas tratadas en los días siguientes a la aplicación.

Período de Carencia Mercado Local (días)

Estos son los días de espera recomendados entre la última aplicación y la cosecha: Algodón, Tomate, Papa y Frijol: 10 días.

Para cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país de destino.

Tiempo de Reingreso al área tratada

No ingresar al área tratada antes de 24 horas desde la aplicación, a menos que se vista ropa de protección.

Observaciones

El fabricante garantiza el porcentaje del contenido activo y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje original cerrado, dentro del plazo establecido en la etiqueta del producto. Las recomendaciones tienen la finalidad de aconsejar al usuario sobre la utilización del producto, sin compromiso, de acuerdo a los últimos conocimientos del fabricante. El usuario asume los riesgos de los daños ocasionados por un almacenamiento o aplicación inadecuados o que no se ajusten a las instrucciones o por factores que escapan a la responsabilidad del fabricante.

Para información respecto a Límites Máximos de Residuos en países de destino para los cultivos, sugerimos consultar con nuestro Departamento Técnico.