

Acetamiprid 200 SP

NOMBRE PRODUCTO	ACETAMIPRID 200 SP
TIPO DE PRODUCTO	Insecticida
INGREDIENTE ACTIVO	Acetamiprid
NOMBRE QUIMICO	(E)-N ¹ -((6-cloro-3-piridil)metil)-N ² -ciano-N ¹ -metilacetamidina
GRUPO QUIMICO	Neonicotinoides
CONCENTRACION Y FORMULACION	200 g/Kg SP Polvo Soluble
MODO DE ACCION	Contacto e Ingestión. Sistémico y traslaminar.
FABRICANTE/FORMULADOR	ANTALIEN
TOXICIDAD	Grupo III. Producto Ligeramente Peligroso
ANTIDOTO	No se conoce un antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Principales Características

Es un insecticida con acción de contacto e ingestión, altamente sistémico y con actividad traslaminar. Altamente eficaz en el control de mosquita blanca en tomates. Presenta un nuevo modo de acción, y es efectivo contra un amplio espectro de insectos de los órdenes Homoptera (pulgones, langostinos, mosquitas blancas), Coleoptera, Lepidoptera y Thysanoptera.

Es ideal para rotación dentro del Programa de Control.

Uso y Dosis

CULTIVOS	USO/Plaga	DOSIS	
		g/200L	Kg/ha
Espárrago	Mosquilla de los brotes (<i>Prodiplosis longifila</i>)		0,5
Palto	Queresa del palto (<i>Fiorinia fioriniae</i>)	100	0,3
Mandarina	Queresa coma (<i>Lepidosaphes becki</i>)	100-200	-
Pimiento	Mosca Blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	100	0,2
Tomate	Mosca Blanca	100	-
Uva de Mesa	Pulgones (<i>Aphididae</i>) Trips californiano (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	100	-

Aplicación

Las aplicaciones deben contemplar el nivel de daño económico de la plaga, por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes para determinar el momento de aplicación.

Pueden ser aplicados cerca de las abejas con la dosis, método de aplicación adecuada, pero no deben aplicarse directamente sobre las abejas en el campo.

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña.

Preparación de la mezcla

Coloque agua en estanque hasta la mitad de su capacidad. En un recipiente aparte, diluya la cantidad necesaria de **ACETAMIPRID 20 SP** en un poco de agua y vierta esta solución al estanque a través del filtro. Luego, complete con agua a capacidad total. Durante el proceso de llenado y posterior aplicación, mantener el agitador funcionando constantemente.

Incompatibilidad

Como es imposible conocer la compatibilidad de **ACETAMIPRID 200 SP** con todos los productos del mercado, ANTALIEN, no asume responsabilidades por mezclas hechas con otros productos.

Se recomienda no mezclar con productos de arcada reacción alcalina o fuertemente oxidantes.

Departamento Técnico Antalien

Perú: Calle Arica N° 125, Ofc 401. Miraflores. Lima. T: 511-4457352

Chile: Padre Mariano N° 391, Ofc 405. Providencia. Santiago. T.: 56-2-240 29 752

www.antalien.net

Fitotoxicidad

Si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta, no es esperable que se produzcan problemas de fitotoxicidad.

En algunas variedades de nectarines puede dañar las hojas, y en algunas variedades de peral asiático puede producir un punteado negro.

Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad, bajo responsabilidad del usuario, para observar los aspectos físicos de las mezclas y sus reacciones sobre las plantas tratadas en los días siguientes a la aplicación.

Período de Carencia Mercado Local (días)

Estos son los días de espera recomendados entre la última aplicación y la cosecha: Espárrago, Mandarina: 14 días; Pimiento, Tomate: 7 días; Uva de Mesa: 30 días; Paltos: 120 días.

Para cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país de destino.

Tiempo de Reingreso al área tratada

No ingresar al área tratada antes de 24 horas desde la aplicación, a menos que se vista ropa de protección.

Observaciones

El fabricante garantiza el porcentaje del contenido activo y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje original cerrado, dentro del plazo establecido en la etiqueta del producto. Las recomendaciones tienen la finalidad de aconsejar al usuario sobre la utilización del producto, sin compromiso, de acuerdo a los últimos conocimientos del fabricante. El usuario asume los riesgos de los daños ocasionados por un almacenamiento o aplicación inadecuados o que no se ajusten a las instrucciones o por factores que escapen a la responsabilidad del fabricante.

Para información respecto a Límites Máximos de Residuos en países de destino para los cultivos, sugerimos consultar con nuestro Departamento Técnico.

Departamento Técnico Antalien

Perú: Calle Arica N° 125, Ofc 401. Miraflores. Lima. T: 511-4457352

Chile: Padre Mariano N° 391, Ofc 405. Providencia. Santiago. T.: 56-2-240 29 752

www.antalien.net

Página 3 de 3
